




Vergoedingsoverzicht Forxiga® (dapagliflozine) augustus 2024¹⁻³

CNS: GVS-vergoeding is onafhankelijk van co-medicatie en co-morbiditeit. **HF:** GVS-vergoeding is onafhankelijk van co-medicatie en co-morbiditeit. **DM2:** GVS-vergoeding voor DM2 is afhankelijk van de co-medicatie en co-morbiditeit. eGFR minimaal ≥ 25 ml/min/1,73 m² bij aanvang therapie, ongeacht de indicatie.

 HF	CO-MORBIDITEIT	CO-MEDICATIE	REGISTRATIE	VERGOEDING	ARTSENVERKLARING
			Onafhankelijk van co-medicatie	✓	✓
 CNS	CO-MORBIDITEIT	CO-MEDICATIE	REGISTRATIE	VERGOEDING	ARTSENVERKLARING
			Onafhankelijk van co-medicatie	✓	✓
 DM2	CO-MORBIDITEIT	CO-MEDICATIE	REGISTRATIE	VERGOEDING	ARTSENVERKLARING
		Metformine en/of SU	✓	✓	Niet nodig
		Monotherapie of andere glucoseverlagende medicatie	✓	TBR	
	eCVD	Onafhankelijk van co-medicatie	✓	✓	EENMALIG ✓
	HF	Onafhankelijk van co-medicatie	✓	✓	EENMALIG ✓
CNS	Onafhankelijk van co-medicatie	✓	✓	EENMALIG ✓	

DM2 = diabetes mellitus type 2; HF=symptomatisch chronisch hartfalen; CNS = chronische nierschade; eCVD= eerder bewezen hart- en vaatziekten.

Dit document is opgesteld in augustus 2024 o.b.v. de toen beschikbare informatie en op verzoek van de arts, apotheker of voorschrijfbegoevde verpleegkundige gedeeld. De meest actuele en complete informatie over vergoeding en indicatiestelling is te vinden op www.farmacotherapeutischkompas.nl en/of in de SmPC van Forxiga.

Referenties: 1. SmPC Forxiga augustus 2024; 2. Farmacotherapeutisch Kompas; 3. <https://www.znformulieren.nl>

Vragen? Wij zijn via de mail te bereiken op Info.NL@astrazeneca.com en telefonisch is onze receptie bereikbaar op nummer +31(0)85 8089900

LET OP: Sinds 1 september 2024 is er geen artsenverklaring meer nodig om Forxiga (dapagliflozine) voor te schrijven.³

Verkorte productinformatie Forxiga 5 en 10 mg filmomhulde tabletten (aug 2024).

Farmaceutische vorm en samenstelling: Elke tablet bevat dapagliflozinepropraandiolmonohydraat, overeenkomend met respectievelijk 5 mg of 10 mg dapagliflozine.

Farmacotherapeutische groep: Geneesmiddelen gebruikt bij diabetes, andere bloedglucoseverlagende geneesmiddelen, uitgezonderd insulines. **ATC-code:** A10BK01.

Indicatie: Diabetes mellitus type 2 (DM2): bij volwassenen en kinderen van 10 jaar en ouder voor de behandeling van onvoldoende gereguleerde DM2 als aanvulling op dieet en lichaamsbeweging: a) als monotherapie wanneer metformine ongeschikt wordt geacht vanwege onverdraagbaarheid; b) als aanvulling op andere geneesmiddelen voor de behandeling van diabetes type 2. Hartfalen (HF): bij volwassenen voor de behandeling van symptomatisch chronisch hartfalen. Chronische nierschade (CNS): bij volwassenen voor de behandeling van chronische nierschade. **Dosering:** DM2: De aanbevolen dosering is 10 mg Forxiga eenmaal daags. Bij patiënten met ernstige leverinsufficiëntie (LI) wordt 5 mg als startdosis aangeraden, als dit goed wordt verdragen, kan de dosis worden verhoogd naar 10 mg als dit geïndiceerd is. HF en CNS: De aanbevolen dosering is 10 mg dapagliflozine eenmaal daags. **Contra-indicaties:** Overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of een van de hulpstoffen. **Waarschuwingen en voorzorgen:** Dapagliflozine mag niet gebruikt worden bij patiënten met diabetes mellitus type 1. Nierinsufficiëntie (NI): Het wordt niet aanbevolen dapagliflozine te starten bij GFR < 25 ml/min. Als GFR < 45 ml/min wordt, moet bij DM2 aanvullende glucoseverlagende behandeling worden overwogen als verdere glykemische controle nodig is. LI: Blootstelling aan Forxiga is verhoogd bij ernstige LI. De werking van Forxiga leidt tot verhoogde diurese wat kan leiden tot matige bloeddrukverlaging. Verhoogd risico op volumedepletie en/of hypotensie: Voorzichtigheid is geboden als door Forxiga geïnduceerde bloeddrukdaling mogelijk risicovol is. Bij gelijktijdige condities die kunnen leiden tot volumedepletie, wordt zorgvuldige controle van de volumestatus aanbevolen. Het wordt aanbevolen om de behandeling met Forxiga tijdelijk te onderbreken bij patiënten die volumedepletie ontwikkelen, totdat dit is gecorrigeerd. Oudere patiënten kunnen een verhoogd risico hebben op volumedepletie, hebben een grotere kans op verminderde nierfunctie en/of om behandeld te worden met diuretica en/of met bloeddrukverlagende middelen die de nierfunctie kunnen veranderen (zoals ACE-remmers en ARB's). Diabetische ketoacidose (DKA): Zeldzame gevallen van DKA, inclusief levensbedreigende en fatale gevallen, zijn gemeld bij patiënten die behandeld werden met SGLT2-remmers, inclusief dapagliflozine. In een aantal gevallen was de openbaring atypisch, met slechts matig verhoogde bloedglucosewaarden, < 14 mmol/l (250 mg/dl). Patiënten dienen onmiddellijk onderzocht te worden op DKA zodra specifieke symptomen optreden, ongeacht de bloedglucosespiegel. Bij vermoedelijke of vastgestelde DKA dient behandeling met Forxiga onmiddellijk gestopt te worden. De behandeling dient onderbroken te worden bij ziekenhuisopnamen voor grote chirurgische ingrepen of ernstige acute medische aandoeningen. Ketonmonitoring wordt aanbevolen bij deze patiënten, bij voorkeur in het bloed. Bij normale ketonwaarden en stabiele toestand van de patiënt, kan dapagliflozine worden herstard. Voorafgaand aan de start met dapagliflozine moeten predisponerende factoren voor ketoacidose in de voorgeschiedenis overwogen worden. SGLT2-remmers dienen met voorzichtigheid te worden gebruikt bij patiënten die mogelijk een hoger risico lopen op DKA. Bij patiënten die DKA ervaren tijdens behandeling met SGLT2-remmers wordt een herstard niet aanbevolen, tenzij andere duidelijke precipiterende factoren worden vastgesteld en opgelost. Fournier-gangreen: Gevallen zijn gemeld bij gebruik van SGLT2-remmers. Dit is een zeldzaam maar ernstig en potentieel levensbedreigend voorval. Patiënten dienen bij combinatie van pijn, gevoeligheid, erytheem of zwelling in het genitale of perineale gebied met koorts of malaise een arts te raadplegen. Een urogenitale infectie of perineaal abces kan aan necrotiserende fasciitis voorafgaan. Als dit vermoed wordt, dient toediening van Forxiga te worden stopgezet en onmiddellijk behandeling (o.a. antibiotica en chirurgisch debridement) te worden ingesteld. Urineweginfecties: Door het werkingsmechanisme zullen patiënten die Forxiga krijgen positief testen op glucose in hun urine. Glucose in de urine kan het risico op urineweginfecties verhogen; tijdens pyelonefritis/urosepsis moet worden overwogen tijdelijk te stoppen met Forxiga. Verhoogd hematocriet: Verhoogd hematocriet is waargenomen bij dapagliflozinebehandeling. Patiënten met uitgesproken hematocrietverhogingen moeten worden gecontroleerd en onderzocht op onderliggende hematologische aandoeningen. Amputatie van onderste ledematen: Toename van het aantal gevallen (voornamelijk van de teen) is waargenomen in klinische lange-termijnstudies bij DM2 met SGLT2-remmers. Het is belangrijk om patiënten met DM te begeleiden bij routinematig preventieve voetzorg. Lactose: Patiënten met de zeldzame erfelijke aandoening galactose-intolerantie, Lapp-lactasedeficiëntie of glucose-galactosemalabsorptie dienen dit geneesmiddel niet te gebruiken. Zwangerschap/borstvoeding: Wanneer zwangerschap wordt vastgesteld, dient de behandeling met Forxiga te worden gestaakt. Forxiga mag niet worden gebruikt in de periode dat borstvoeding wordt gegeven. **Interacties:** Forxiga kan het diuretisch effect van thiazide- en lisdiuretica versterken met mogelijk een verhoogd risico op dehydratatie en hypotensie. Bij DM2-patiënten kan bij gecombineerd gebruik met Forxiga een lagere dosering insuline of insulinesecretie-bevorderende middelen zoals sulfonylureumderivaten (SU) nodig zijn om het risico op hypoglykemie te verkleinen. De serumconcentratie van lithium moet gemonitord worden, door de arts die lithium voorschrijft, na start en na dosisaanpassing van dapagliflozine. Monitoren van bloedglucoseregulatie met de 1,5-AG test is onbetrouwbaar bij patiënten die SGLT2-remmers gebruiken en wordt niet aanbevolen. **Bijwerkingen:** Zeer vaak (≥1/10): hypoglykemie (bij gebruik met SU of insuline). Vaak (≥1/100, <1/10): vulvovaginitis, balanitis en gerelateerde genitale infecties, urineweginfectie, zuizeligheid, rash, rugpijn, dysurie, polyurie, verhoogd hematocriet, verminderde nierklaring creatinine gedurende initiële behandeling, dyslipidemie. Soms (≥1/1.000, <1/100): schimmelinfectie, volumedepletie, dorst, obstipatie, droge mond, nycturie, vulvovaginale pruritus, genitale pruritus, verhoogd bloedcreatinine gedurende initiële behandeling, verhoogd bloedureum, gewichtsafname. Zelden (≥1/10.000, <1/1.000): DKA (wanneer gebruikt bij DM2). Zeer zelden (<1/10.000): Fournier-gangreen, angio-oedeem, tubulo-interstitiële nefritis. **Afleverstatus:** U.R., voor vergoedingsstatus zie www.medicijnkosten.nl **Uitgebreide productinformatie:** Voor de volledige productinformatie wordt verwezen naar de SmPC-tekst op www.astrazeneca.nl. Voor overige informatie: AstraZeneca BV, Postbus 93015, 2509 AA Den Haag. Tel. 085 808 9900. NL-14387 Prod 08.2024

NL-14317 Prod 08.2024

AstraZeneca 


forxiga
(dapagliflozine)